

Umgang mit Krankheitsanzeichen: Darf mein Kind in die KiTa oder Schule?

Mein Kind hat ...

Leichte Erkältungssymptome

Es ist kein negativer Virusnachweis nötig.
Empfohlen wird jedoch ein Antigen-Selbsttest*
in der Häuslichkeit zweimalig in den ersten 5
Tagen ab Symptombeginn – nach Möglichkeit
am Tag des Symptombeginns und an Tag 3.

**Positiver
Selbsttest**

Mein Kind ist akut erkrankt, es hat ...

Schwere Krankheitssymptome, die ärztlicher Abklärung bedürfen

Kein Besuch der Einrichtung bzw. getrennte Betreuung vor Ort bis Abholung
Vorstellung bei Haus- oder Kinderarzt/-ärztin,
Ärztliche Entscheidung zur erforderlichen differentialdiagnostischen Abklärung der
Symptomatik mittels PCR (o.ä. Nukleinsäurenachweis) auf SARS-CoV-2.
Ein positiver Ag-Test erfordert immer eine PCR-Untersuchung.

Bitte
tel. Kontakt
aufnehmen,
insbesondere
bei Kontakt zu
SARS-CoV-2-
Positiven od.
bei Geruchs,-
Geschmacks-
verlust

Keine Einschränkung
Besuch der
Gemeinschaftseinrichtung möglich

Andere ärztliche Diagnose
ohne erforderliche
SARS-CoV-2-Testung

Besuch der Gemeinschafts-
einrichtung
(mit Selbsterklärung) nach
ärztlicher Einschätzung möglich

**Negativer Test + Symptomatik mit
Fieber oder Beeinträchtigung des
Allgemeinzustandes, kein Besuch
der Gemeinschaftseinrichtung**

Nach 48 Stunden Fieberfreiheit
und bei deutlich gebesserter
Allgemeinzustand Besuch der
Gemeinschaftseinrichtung (mit
Selbsterklärung) möglich

**Positiver SARS-CoV-2
Rachenabstrich(PCR o. ä.
Nukleinsäurenachweis)**

Kein Besuch der
Gemeinschaftseinrichtung
Häusliche Isolation für 14
Tage mit Testung (Antigen-
Selbsttest*) am Ende der
Isolationszeit